

ACC[®] 200 pezsgőtabletta

acetilcisztein

- Mielőtt elkezdené alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót!
- Ez a gyógyszer orvosi vény nélkül kapható, az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen a gyógyszer körültekintő alkalmazása.
- Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet!
- További információkért forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez!
- Sürgősen keresse fel orvosát, ha a tünetei egy héten belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak!

Mi az ACC 200 pezsgőtabletta, és mire szolgál?

Az ACC 200 pezsgőtabletta, aminek hatóanyaga az acetilcisztein, a légutakban levő sűrű viszkózus váladék oldására alkalmas. Fokozott viszkózitású nyák termelődésével, hurutos köhögéssel járó légúti betegségek váladékkoldást elősegítő terápiájában javallt.

Hatóanyag: 200 mg acetilcisztein pezsgőtablettánként.

Segédanyagok: trinátrium-citrát-dihidrát, szacharin-nátrium, aszkorbinsav, fekete szeder aroma, mannit, laktózanhidrát, nátrium-hidrogén-karbonát, vízmentes citromsav.

Mikor nem szabad az ACC 200 pezsgőtablettát szedni?

- Acetilciszteinnel vagy a készítmény bármely összetevőjével szemben fennálló túlérzékenység esetén.
- Egyes szénhidrátanyagcsere-zavarok (pl. laktóz- és galaktózbontó enzimhiány, glükóz és galaktóz felszívódási zavarok) esetén nem szabad alkalmazni, mivel a pezsgőtabletta laktózt tartalmaz.
- 6 éves kor alatti gyermekek kezelésére nem szabad alkalmazni.
- Terhesség és szoptatás ideje alatt szedése nem javasolt.
- Asztmában, nyelőcsői vénatágulatban, gyomorfekélyben szenvedő betegeknek csak orvosi rendelésre és orvosi ellenőrzés mellett szabad szedni a gyógyszert. Amennyiben Ön asztmás, vagy korábban asztmás rohamai voltak, vagy nyelőcsői vénatágulata vagy gyomorfekélye van, az ACC 200 pezsgőtabletta szedése előtt tájékoztassa betegségéről háziorvosát, mert asztmás betegekben a készítmény fokozhatja az asztmás rohamok veszélyét, nyelőcsői vénatágulat vagy gyomorfekély esetén az acetilcisztein miatti esetleges hányás fokozhatja a vérzés veszélyét.

Forduljon orvosához, ha a fentiekben leírtak valamelyike érinti Önt, vagy bármikor a múltban érintette Önt!

Mit kell tudnia az egyéb gyógyszerek szedéséről?

- Egyes antibiotikumok hatását az acetilcisztein csökkentheti, ezért biztonsági okokból az antibiotikumokat az ACC-től külön és legalább 2 óra elteltével ajánlott alkalmazni.
- Köhögéscsillapítókkal együtt nem szabad szedni, mivel a köhögési reflex gátlása következtében veszélyes váladékfelhalmozódás alakulhat ki.

Jelenleg, illetve közelmúltban szedett receptköteles vagy recept nélkül kiváltható gyógyszereiről tájékoztassa orvosát vagy a gyógyszerészt!

Hogyan kell alkalmazni az ACC 200 pezsgőtablettát?

Az ACC 200 pezsgőtablettát evés után kell bevenni. A pezsgőtablettát egy pohár vízben való feloldás után rövid időn belül kell meginni.

Kivételes esetekben az aszkorbinsav (C-vitamin) stabilizáló hatása miatt az ivásra kész oldatot kb. 2 órán át lehet állni hagyni, esetleg meleg folyadékban is. A bőséges folyadékfogyasztás segíti az acetilcisztein nyákolódó hatását.

Amennyiben az orvos másképpen nem rendel, a szokásos adagolás:

Felnőttek és 14 éven felüli gyermekeknek: naponta 3 x 1 ACC 200 pezsgőtabletta.

6-14 éves kor közötti gyermekeknek: naponta 2 x 1 ACC 200 pezsgőtabletta.

Hosszabb ideig kizárólag az orvos utasítására, az orvos által előírt adagban és ideig alkalmazható!

Ha az előírtnál több ACC 200 pezsgőtablettát vett be, azonnal forduljon orvosához vagy gyógyszerészhöz! Ha adagját elfelejtette bevenni, a következő alkalommal ne vegyen be dupla adagot!

Befolyásolja-e a készítmény a járművezetői és gépkezelői képességeket?

A készítmény fenti képességeket befolyásoló hatása nem ismert.

Milyen nem kívánt hatásai lehetnek az ACC 200 pezsgőtablettának és mi a teendő, ha ezek jelentkeznek?

Mint minden gyógyszernek, az ACC 200 pezsgőtablettának is lehetnek mellékhatásai.

Ritkán fejfájás, szájnyálkahártya-gyulladás és fülzúgás jelentkezhet.

Egyes esetekben hasmenés, gyomorégés, hányinger, hányás fordulhat elő.

Mellékhatások vagy bármilyen szokatlan tünet jelentkezéséről tájékoztassa orvosát!

Minden gyógyszerrel szemben kialakulhat túlérzékenységi reakció, ezért felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben a következő tünetek bármelyikét észleli: vérnyomásesés, hörgőgörcs, bőrkütiés, csalánkiütés, viszketés, szapora szívverés, hagyja abba a gyógyszer szedését és feltétlenül forduljon kezelőorvosához!

Hogyan kell az ACC 200 pezsgőtablettát tárolni?

A pezsgőtabletták tartályban csomagolva legfeljebb 25°C-on, tasakban csomagolva legfeljebb 30°C-on tárolandók. A tablettá kivétele után a tartályt újra szorosan le kell zárni!

A gyógyszert a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Sandoz Hungária Kft.,
1034 Budapest, Tímár utca 20.

Gyártó:

HEXAL AG, Industriestrasse 25, 83607 Holzkirchen, Germany

OGYI-T-5858/01-02

A betegájékoztató engedélyezésének dátuma:
2008. március 13.

599582
77418-0508

 **SANDOZ**