



Alka-Seltzer® N

pezsgőtabletta

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót.

Ez a gyógyszer orvosi vény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő alkalmazása.

- Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei néhány napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

A betegájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer az Alka-Seltzer N pezsgőtabletta és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók az Alka-Seltzer N pezsgőtabletta szedése előtt.
3. Hogyan kell szedni az Alka-Seltzer N pezsgőtablettát?
4. Lehetséges mellékhatások
5. A készítmény tárolása

Mit tartalmaz az Alka-Seltzer N pezsgőtabletta?

Hatóanyag:

324 mg acetilszalicilsav pezsgőtablettánként.

Segédanyagok:

Dokuzát-nátrium, nátrium-benzoát, dimetikon, kalcium-szilikát, citrom aroma, zöldcitrom aroma, szacharin-nátrium, povidon 25, vízmentes citromsav, nátrium-hidrogén-karbonát.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Bayer Hungária Kft. Budapest

Gyártó:

Bayer Bitterfeld GmbH, Greppin, Németország

1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER AZ ALKA-SELTZER N PEZSGŐTABLETTA ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

Az acetilszalicilsav a nem szteroid fájdalomcsillapítók és gyulladáscsökkentők csoportjába tartozik. Alkalmazható enyhe és közepes fájdalom esetében, mint fejfájás, fogfájás, hátfájás, ízületi fájdalmak és menstruációs fájdalom, továbbá lázas, meghűléses és gyulladós állapotokban. Az Alka-Seltzer N pezsgőtabletta nem alkalmazható hosszú időn keresztül, vagy nagy adagokban az orvos megkérdése nélkül.

2. TUDNIVALÓK AZ ALKA-SELTZER N PEZSGŐTABLETTA SZEDÉSE ELŐTT

Mely esetekben nem szedheti az Alka-Seltzer N pezsgőtablettát?

Alka-Seltzer N pezsgőtablettát nem szabad szedni a következő állapotok bármelyikének megléte esetén:

- acetilszalicilsavval vagy egyéb szalicilátokkal szembeni ismert túlérzékenység esetén,
- fokozott vérékenység esetén,
- gyomor- és nyombélfékely esetén,
- terhesség utolsó 3 hónapjában.

Mikor kell különösen óvatosnak lennie az Alka-Seltzer N pezsgőtabletta szedésekor?

Az Alka-Seltzer N pezsgőtabletta nagyon óvatosan alkalmazható az alábbi esetekben:

- Terhesség első és második harmadában;
- Szoptatás ideje alatt;
- Gyulladáscsökkentőkkel, reuma ellenes szerekkel szembeni túlérzékenység fennállásakor;
- Véralvadásgátló készítményekkel történő egyidejű kezelés (pl. kumarin - származékok, heparin /kivéve az alacsony dóziszú heparin kezelést/) esetén;
- Súlyos máj-, vagy veseműködési zavarokban;
- Gyomor- és bélrendszeri rendellenességek esetén,
- Asztma, krónikus légúti megbetegedések, orrpolip előfordulásakor.
- Gyermekeknek és fiatalok számára lázas megbetegedésben kizárólag orvosi előírásra és csak akkor adható, ha más kezelés nem jár eredménnyel. Tartós hányás fellépése esetén azonnal orvost kell hívni, mivel ez egy ritka, de nagyon veszélyes betegség jele lehet.
- Nátrium-szegény diétán lévő betegeknek figyelembe kell venni, hogy a készítmény nátriumot tartalmaz.

Fontos információk a kezelés ideje alatt szedett egyéb gyógyszerekkel kapcsolatban:

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett és/vagy alkalmazott egyéb gyógyszereiről, beleértve a vény nélkül kapható készítményeket is.

Alka-Seltzer N pezsgőtablettával történő együttes alkalmazás esetén az alábbi gyógyszerek hatása fókuszódik:

- véradványgátlók,
- nem szteroid gyulladáscsökkentők,
- egyes vércukorszint csökkentők (szulfonilkarbamid),
- metotrexát,
- szulfonamidok és kombinációi,
- valproinsav,
- digoxin, barbiturátok és lítium plazmakoncentrációja,
- kortikoszteroidok alkalmazása vagy *egyidejű alkoholfogyasztás* esetén az acetilszalicilsav fokozhatja a gyomor-bél rendszer vérzésének veszélyét.

Alka-Seltzer N pezsgőtablettával történő együttes alkalmazás esetén az alábbi gyógyszerek hatása csökken:

- vérnyomáscsökkentők,
- gyors hatású vizelethajtók és aldosteron antagonisták,
- húgysavürítők.

Az Alka-Seltzer N pezsgőtabletta alkohollal történő együttes fogyasztása esetén az alkohol növelheti az acetilszalicilsav által kiváltott gyomornyálkahártya károsodást.

Terhesség vagy szoptatás ideje alatt szedhető-e az Alka-Seltzer N pezsgőtabletta?

A terhesség első 6 hónapjában csak indokolt esetben, a kezelőorvossal való megbeszélés szerint alkalmazható.

A terhesség utolsó 3 hónapjában nem alkalmazható a vérzékenységi hajlam fokozódása miatt. Szoptatás időszakában is csak nagyon indokolt esetben és a szokásosnál kisebb adagokban adható. Amennyiben nagyobb adagok alkalmazása szükséges hosszabb ideig, úgy meg kell fontolni az idő előtti elválasztás szükségességét.

Az Alka-Seltzer N pezsgőtabletta hatása a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességekre

Nincs adat.

3. HOGYAN KELL SZEDNI AZ ALKA-SELTZER N PEZSGŐTABLETTÁT?

Amennyiben a kezelőorvos másképpen nem rendel, a készítmény szokásos adagja:

Felnőttek: egyszeri adag 1-3 pezsgőtabletta, ami 4 - 8 óránként ismételhető.

A napi adag maximum 12 pezsgőtabletta.

Gyermekeknek 7 éves kor felett: egyszeri adag 1 pezsgőtabletta.

Szükség esetén ez naponta legfeljebb 3x adható, 4-8 óránként.

Alkalmazás: A pezsgőtablettákat 1 pohár vízben fel kell oldani és meginni.

Ha az előírtnál több Alka-Seltzer N pezsgőtablettát vett be:

Haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Ha elfelejtette bevenni az Alka-Seltzer N pezsgőtablettát:

A soron következő előírt adagolási időpontban ne alkalmazzon dupla adagot.

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszernek, az Alka-Seltzer N pezsgőtablettának is lehetnek mellékhatásai.

Előfordulhatnak gyomor- és bélpanaszok, mint pl. hányinger, hányás, hasmenés és enyhe vérvesztés a gyomor-bél rendszerből, ami egyes esetekben vashiányos vérszegénységhez vezethet. Esetileg kifejlődhet gyomor- vagy nyombélfekély, gyomor-bél rendszeri vérzéssel (tünetei: vérhányás, szurokszéket), gyomor-bél rendszeri átfürödással.

Ritkán kialakulhatnak túlérzékenységi reakciók, mint pl. asztmás roham, bőrkiütések. Egyes esetekben előfordulhatnak máj- és veseműködési zavarok, alacsony vércukorszint és súlyos bőrreakciók.

Túladagolási tünetek: szédülés és fülzúgás, ami főleg gyermekeknél és idős betegeknél fordulhatnak elő. Haladéktalanul értesítse kezelőorvosát, amennyiben a felsorolt mellékhatások közül bármelyik előfordul, vagy egyéb mellékhatást észlel.

5. A KÉSZÍTMÉNY TÁROLÁSA

Szobahőmérsékleten, legfeljebb 25°C -on tárolandó.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

A gyógyszert csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

Csomagolás:

2 tablettá szalagfóliában.

5 szalagfólia (10 tablettá) dobozban.

OGYI-T-8081/01

Betegtájékoztató OGYI-eng. száma: 24325/55/03

Bayer

01512981