

DAOSin®

DiAminoOxidáz tartalmú kapszula
Hisztamin-tartalmú ételek fogyasztásához



DAOSin®

DiAminoOxidáz tartalmú kapszula
Hisztamin-tartalmú ételek fogyasztásához



Fontos figyelmeztetés

Csak orvosi ellenőrzés mellett alkalmazandó.
Nem használható egyedüli tápanyagforrásként.
Kérjük, olvassa el a felhasználási tájékoztatót!
Gyermekektől elzárva tartandó.
Hűvös, száraz helyen tárolandó.
Az alkohol gátolja a DiAminoOxidáz enzim aktivitását.

Ellenjavallat:

terhesség, szoptatás, szívkoszorúér-
betegség, instabil hipertónia, súlyos asztma
www.daosin.hu

Forgalmazza:

Mitra-Pont Kft.

1085 Budapest, Röck Szilárd u. 17.

info@daosin.hu

SCIOTEC
DIAGNOSTIC TECHNOLOGIES

A SCIOTEC Diagnostic Technologies GmbH
Ausztria hivatalos disztribútora



- ▶ **Pizzától kiütés?**
- ▶ **Vörösborra migrén?**
- ▶ **Gondolt már a hisztamin érzékenységre?**



- ▶ **Ismeri a DAOSIN® kapszulát?**



A DAOSIN® DiAminoOxidáz enzimet tartalmazó speciális-gyógyászati célra szánt tápszer, mely hisztamin érzékenyeknek ajánlott hisztamin tartalmú ételek fogyasztása esetén

Mi a hisztamin-érzékenység?

Hisztamin tartalmú ételek élvezete után 20-30 perccel, ritkábban pedig 2-3 nap múltán alakulhatnak ki olyan, allergiához hasonló, vagy más tünetek, mint

- Hasmenés, hasi fájdalom, görcsök, puffadás
- Fejfájás, egészen a migrénes rohamokig
- Bőrkkiütés, viszketés, hólyagok a bőrön,
- Asztma, légzési nehézség
- Émelygés, szívdobogás, szédülés
- Orrdugulás vagy orrfolyás

Ennek oka lehet a hisztamint* lebontó DAO (DiAminoOxidáz) enzim hiánya a szervezetben.

*A hisztamin az élő szövetekben jelen levő természetes anyag (biogén amin), mely közvetítőként játszik szerepet például allergiás reakciókban. Az egészséges szervezetben képződő enzim, a DiAminoOxidáz (DAO) a hisztamint a bélben lebontja, és így hatástalanítja.



Hisztamint tartalmazó vagy felszabadító élelmiszerek:
Hosszasan érlelt vagy tárolt élelmiszerek, mint például:

- savanyú káposzta, kovászos uborka
- alkoholok: vörösbor, fehérbor, pezsgő, sör,
- húsfélék: füstölt kolbász, szalámi,
- érett sajtok, sajtfondü
- tonhal, szardínia, tenger gyümölcsei és
- spenót, paradicsom, eper, ananász, szója,
- csokoládé

Nagyon kifejezett tüneteket okozhat a magas hisztamin tartalmú élelmiszerek együttes fogyasztása, ha például vörösbort sajttal fogyasztunk

Mi a DAOSIN® hatóanyaga?

DiAminoOxidáz (DAO) enzimet (36000 HDU) tartalmazó fehérjekivonat (4,2 mg kapszulánként)

Hogyan működik a DAOSIN® kapszula?

A testünkben hiányzó DAO enzimet pótolja, így segít lebontani a hisztamint.

Ezzel meggyorsul a bélrendszerben a táplálékból bekerült, kellemetlen tüneteket kiváltó hisztamin feldolgozása.

Hogyan alkalmazzuk a DAOSIN® kapszulát?

Vegyen be étkezés előtt – a táplálék hisztamin tartalmának megfelelően – egy vagy két kapszulát kevés folyadékkal. A napi adag ne haladja meg a 3 kapszulát!